

## 14.—Mortinatalité, par cause, 1965

N° de la Liste internationale	Cause	Garçons	Filles	Total
Y 30	Maladie chronique de la mère.....	63	52	115
Y 31	Maladie aiguë de la mère.....	11	10	21
Y 32	Maladies et affections de la grossesse et de l'accouchement.....	199	159	358
Y 33	Absorption de substances toxiques provenant de la mère.....	2	—	2
Y 34	Dystocies.....	124	101	225
Y 35	Autres causes provenant de la mère.....	37	39	76
Y 36	Anomalies du placenta et du cordon.....	1,059	820	1,879
Y 37	Traumatismes obstétricaux.....	31	13	44
Y 38	Malformation congénitale du fœtus.....	288	363	651
Y 39	Maladies du fœtus et causes mal définies.....	788	688	1,476
	<b>Toutes causes.....</b>	<b>2,602</b>	<b>2,245</b>	<b>4,847</b>

## Section 3.—Décès\*

On ne dispose pas de chiffres officiels concernant la mortalité brute† pour la période antérieure à 1921, mais les études relatives aux premiers recensements fournissent les indications suivantes:

Période intercensale	Moyenne estimative de mortalité brute annuelle (pour 1,000 habitants)	Période intercensale	Moyenne estimative de mortalité brute annuelle (pour 1,000 habitants)
1851-1861.....	22	1891-1901.....	16
1861-1871.....	21	1901-1911.....	13
1871-1881.....	19	1911-1921.....	13
1881-1891.....	18		

Comme toute population de pionniers, le Canada a connu une forte mortalité au milieu des années 1850, alors que le pays était en pleine colonisation. On estime que la mortalité brute durant cette période s'est établie entre 22 et 25. Bien qu'aucun chiffre ne soit disponible, il reste à supposer que la mortalité à tous les âges ayant été élevée, celle chez les nourrissons, les enfants et les jeunes adultes doit l'avoir été tout particulièrement, puisque même durant les années 1920 la mortalité à ces âges était encore très forte. Avec l'accroissement graduel de la densité démographique, de l'urbanisation et de l'amélioration de l'hygiène et des services médicaux, le taux brut a diminué d'environ 22 à 11 au cours des 80 années 1851-1930. Par la suite, il n'a pas cessé de baisser, jusqu'à presque 8 à la fin des années 1950, et a atteint son plus bas niveau de 7.5 en 1966. C'est là un des taux bruts les plus faibles du monde.

Le tableau 1, pp. 262-263, montre les tendances provinciales et territoriales depuis 1941. Le taux généralement bas des provinces des Prairies tient en partie à ce que leur population est, en moyenne, plus jeune qu'ailleurs, tandis que le taux uniformément plus élevé en Colombie-Britannique est surtout attribuable à la présence d'une proportion considérable de personnes âgées.

## Sous-section 1.—Mortalité générale

**Répartition de la mortalité selon l'âge et le sexe.**—Depuis qu'on dresse une statistique nationale de l'état civil au Canada (1921), la mortalité à tous les âges n'a pas cessé de diminuer considérablement. La baisse de la mortalité chez les bébés, les enfants et les jeunes adultes contribue pour beaucoup à faire reculer le taux global des décès. En 1931, plus de 19 p. 100 de tous les décès masculins sont survenus chez des personnes âgées de 5 à 44 ans; en 1965, 10.5 p. 100 des décès frappaient ce groupe d'âge. Chez les femmes du même groupe d'âge, la proportion a diminué d'un peu moins de 22 p. 100 en 1931 à 7.5 p. 100 en 1965.

\*Comparaisons internationales à la section 7, pp. 301-302.

†Le taux brut est celui qui se fonde sur la population totale.