

Mortalité infantile dans les agglomérations urbaines.—La mortalité infantile varie ordinairement beaucoup d'une année à l'autre, dans les différentes cités et villes, à cause du nombre relativement peu élevé des décès d'enfants qui y surviennent. Comme le montre le tableau 2 (pp. 264-266), plusieurs villes, toutefois, conservent constamment une mortalité infantile très faible en comparaison de celle du pays ou de la province.

Causes de décès d'enfants.—En 1965, près de 70 p. 100 des décès d'enfants ont résulté de la débilité, des malformations congénitales, de la pneumonie, de l'asphyxie et de l'atélectasie postnatales et de lésions obstétricales. La débilité fut la cause fondamentale de 1,827 décès et la cause secondaire de 2,441 autres. Les malformations congénitales ont provoqué 1,821 décès d'enfants; la pneumonie, 1,117; l'asphyxie postnatale, 1,083 et les lésions obstétricales, 996. Les taux de toutes ces causes n'ont pas changé ou ont diminué en 1965.

21.—Décès d'enfants et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1963-1965

N° de la Liste internationale	Cause de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1963	1964	1965	1963	1964	1965
001-019	Tuberculose.....	5	3	4	1	1	1
020-029	Syphilis.....	3	—	1	1	—	—
045-048	Dysenterie.....	1	1	—	—	—	—
050	Scarlatine.....	—	—	—	—	—	—
056	Coqueluche.....	24	15	5	5	3	1
057	Infections à méningocoques.....	16	18	18	3	4	4
085	Rougeole.....	24	23	27	5	5	6
140-239	Tumeurs.....	48	45	31	10	10	7
273	Maladies du thymus.....	5	12	11	1	3	3
325	Déficience mentale.....	67	58	48	14	13	11
340	Méningite (non méningococcique).....	77	86	73	17	19	17
391, 392	Otite moyenne.....	49	63	40	11	14	10
470-475	Infections aiguës des voies respiratoires.....	46	30	36	10	7	9
480-483	Grippe.....	100	37	35	21	8	8
490-493	Pneumonie (4 semaines et plus).....	1,146	948	831	246	209	199
500-502	Bronchite.....	45	72	55	10	16	13
543	Gastrite et duodénite.....	3	2	1	1	—	—
560-570	Hernie et occlusion intestinale.....	108	96	104	23	21	25
571	Gastro entérite et colite.....	372	208	172	80	46	41
572	Entérite chronique et colite ulcéreuse.....	2	3	2	—	1	—
750-759	Malformations congénitales.....	2,068	1,969	1,821	444	435	435
760, 761	Lésions obstétricales.....	1,232	1,170	996	265	258	238
762	Asphyxie et atélectasie postnatales.....	1,368	1,256	1,083	294	277	259
763	Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	360	367	286	77	68	68
764	Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	67	57	30	14	13	7
765-768	Autres infections du nouveau-né.....	50	41	34	11	9	8
769	Toxémie prénatale.....	87	91	56	19	20	13
770	Erythroblastose.....	289	251	218	62	55	52
771	Maladie hémorragique du nouveau-né.....	83	93	73	18	21	17
772	Déséquilibre alimentaire.....	35	36	29	8	8	7
773	Maladies mal définies particulières à la naissance.....	1,118	1,077	1,049	240	238	251
774-776	Débilité.....	2,348	2,159	1,827	504	477	436
795	Causes mal définies ou inconnues.....	51	27	10	11	6	2
E810-E825	Accidents de la circulation dus à des véhicules automobiles.....	19	32	15	4	7	4
E900-E904	Chutes accidentelles.....	13	9	10	3	2	2
E916	Accidents causés par le feu.....	22	18	23	5	4	5
E921, E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou de corps étrangers dans les voies respiratoires.....	290	276	250	62	61	62
E924, E925	Suffocation mécanique accidentelle.....	162	158	141	35	35	34
	Autres morts accidentelles et violentes.....	50	43	44	11	9	11
	Autres causes déterminées.....	417	379	364	90	84	87
	Total, toutes causes.....	12,270	11,169	9,862	2,634	2,466	2,356

Âge au décès.—Des 9,862 nouveau-nés décédés au cours de leur première année de vie, 6,835 ou près de 70 p. 100 n'avaient pas un mois; 4,029 sont décédés le jour de leur naissance, 2,116 entre le second et le septième jour, et 690 au cours des trois semaines qui ont suivi la naissance.