

après l'accouchement, les décès périnataux sont généralement considérés comme comprenant le total des mort-nés qui ont cessé de vivre après au moins 28 semaines de gestation et les décès de nouveau-nés qui ne survivent pas à leur première semaine d'existence.

En 1965, il y a eu 10,992 décès périnataux, dont 4,847 mort-nés et 6,145 nouveau-nés qui n'ont pas survécu une semaine, et le taux national de ces décès s'est établi à 26 pour 1,000 accouchements. Le taux des décès périnataux a diminué lentement mais régulièrement de 65.2 en 1921 à 26 en 1965.

Sous-section 3.—Mortalité puerpérale

Le nombre de mères mortes enceintes ou en couches a fort diminué durant les deux dernières décennies, comme l'indique le tableau 1, pp. 262-263, ayant atteint le chiffre le plus bas, soit 135, en 1965. Depuis 1951, la mortalité puerpérale pour 10,000 naissances, est inférieure à 10 et, depuis 1959, à cinq. Malgré cette amélioration, la mortalité puerpérale au Canada (3.2 en 1965) dépasse le taux de plusieurs autres pays (voir page 302). La mortalité chez les mères non mariées est plus élevée que chez les mariées.

Causes de la mortalité puerpérale.—La tableau 24 donne les principales causes de mortalité puerpérale en 1963-1965.

24.—Mortalité puerpérale et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1963-1965

N° de la Liste internationale	Cause de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1963	1964	1965	1963	1964	1965
	Complications de la grossesse	43	35	42	9	8	13
640, 641	Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la gestation	6	3	2	1	1	—
642	Toxémies gravidiques	21	17	21	5	4	5
643	Placenta prævia remarqué avant l'accouchement	—	—	1	—	—	—
644	Autres hémorragies gravidiques	—	—	2	—	—	—
645	Grossesse ectopique	8	6	4	2	1	1
646-649	Autres états pathologiques résultant de la grossesse	8	9	12	2	2	3
	Avortement	27	22	14	6	5	3
650, 652	Avortement sans mention d'infection	6	10	4	1	2	1
651	Avortement avec infection	21	12	10	5	3	2
	Complications de l'accouchement	67	48	43	14	11	10
670	Accouchement compliqué de placenta prævia ou d'hémorragie ante partum	20	6	5	4	1	1
671	Accouchement compliqué de rétention placentaire	5	4	5	1	1	1
672	Accouchement compliqué d'autres hémorragies post-partum	6	15	11	1	3	3
673, 674	Accouchement dystocique par anomalie du bassin osseux ou position anormale du fœtus	8	5	4	2	1	1
675	Accouchement dystocique par prolongation du travail d'autre origine	4	1	—	1	—	—
676, 677	Accouchement avec déchirure ou d'autres traumatismes	10	11	13	2	2	3
678	Accouchement avec d'autres complications	14	6	5	3	1	1
	Complications des suites des couches	28	32	36	6	7	9
680	Infection urinaire post-partum, sans autre infection	—	1	—	—	—	—
681	Infection pendant l'accouchement ou les suites de couches	4	5	7	1	1	2
682-684	Phlébite et thrombo-phlébite post-partum, pyrexie, embolie pulmonaire	9	13	17	2	3	1
685, 686	Éclampsie et toxémie post-partum	5	1	5	1	—	1
687-689	Complications des suites des couches, autres ou sans précisions	10	12	7	2	3	2
	Total, toutes causes puerpérales	165	137	135	35	33	32