

**Région forestière montagnarde.** Cette région occupe une grande section des plateaux intérieurs de la Colombie-Britannique ainsi qu'une partie de la vallée de la Kootenay et une petite surface sur le versant oriental des Rocheuses. C'est le prolongement septentrional du type de forêt de la majeure partie du système montagneux de l'Ouest des États-Unis, et il touche aux régions côtière, de Columbia et subalpine. Le pin ponderosa est une essence caractéristique des zones méridionales. Le sapin de Douglas croît un peu partout, mais surtout dans le centre et le sud de la région. On y trouve aussi le pin lodgepole et le tremble, ce dernier abondant dans le centre-nord. Dans les zones septentrionales, l'épinette d'Engelmann et le sapin de l'Ouest de la région subalpine se font plus nombreux, de même que le bouleau à papier; l'épinette blanche, bien qu'elle soit principalement d'affinité boréale, y apparaît aussi. Dans bon nombre de vallées sillonnées de cours d'eau se trouvent de vastes étendues de fétuques et d'herbages.

**Région forestière côtière.** Cette région comprend une partie de la forêt de la côte du Pacifique de l'Amérique du Nord. Essentiellement résineuse, elle est composée surtout du cèdre de l'Ouest et de la pruche de l'Ouest; l'épinette de Sitka abonde dans le nord et le sapin de Douglas dans le sud. Le sapin amabilis et le cyprès jaune y sont nombreux et, de même que la pruche de Mertens et le sapin de l'Ouest, ils poussent à de hautes altitudes. Le pin blanc de l'Ouest croît dans les parties méridionales et l'if de l'Ouest, ici et là. Les feuillus comme le peuplier baumier de l'Ouest, l'aulne de l'Orégon et l'érable à grandes feuilles y sont clairsemés. Le modroño, arbre à larges feuilles toujours vert, et le chêne de Garry ne se rencontrent que sur la côte sud-est de l'île Vancouver, dans les îles adjacentes et sur la terre ferme voisine. Les centres de peuplement de ces essences se trouvent plus au sud, aux États-Unis.

**Région forestière acadienne.** La majeure partie des provinces Maritimes est couverte d'une forêt très semblable à celle de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent et, dans une moindre mesure, à celle de la région boréale. L'essence caractéristique est l'épinette rouge, à laquelle s'associent le sapin baumier, le merisier et l'érable à sucre, et un certain nombre de pins rouges, pins blancs, pins gris et pruches. Le hêtre américain était plus important dans le passé, mais la maladie corticale l'a décimé en Nouvelle-Écosse, dans l'Île-du-Prince-Édouard et dans le sud du Nouveau-Brunswick. Les autres essences qui abondent sont l'épinette noire, l'épinette blanche, le chêne rouge, l'orme blanc, le frêne noir, l'érable rouge, le bouleau à papier, le bouleau gris et le peuplier. Le cèdre blanc, qui pousse au Nouveau-Brunswick, est très rare ailleurs, et le pin gris est apparemment absent de la vallée supérieure de la rivière Saint-Jean et de l'ouest de la Nouvelle-Écosse.

**Région forestière de Columbia.** Une grande partie de la vallée de la rivière Kootenay, les vallées supérieures de la Thompson et du Fraser ainsi que la région du lac Quesnel, en Colombie-Britannique, renferment une forêt résineuse qui ressemble beaucoup à celle de la région côtière. Le cèdre de l'Ouest et la pruche de l'Ouest sont les essences caractéristiques de cette «ceinture humide» de l'intérieur. On y trouve également le sapin de Douglas et, vers le sud, le pin blanc de l'Ouest, le mélèze de l'Ouest, le sapin de Vancouver et l'if de l'Ouest. L'épinette d'Engelmann de la région subalpine abonde dans la vallée supérieure du Fraser et croît quelque peu aux niveaux élevés de la forêt dans le reste de la région. À des altitudes plus basses dans l'ouest et dans certains secteurs de la vallée de la Kootenay, la forêt se confond avec celle de la région montagnarde et, en quelques endroits, longe la prairie.

**Région forestière des feuillus.** Une petite portion de la forêt des feuillus, qui occupe une surface étendue aux États-Unis, pénètre dans le sud-ouest de l'Ontario entre les lacs Huron, Érié et Ontario. On y trouve, dispersées parmi les feuillus communs à la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent tels que l'érable à sucre, le hêtre américain, l'orme blanc, le bois blanc, le frêne rouge, le