




Saint-Laurent s'étend vers l'intérieur une forêt aux essences mélangées dont les principales sont le pin blanc, le pin rouge, la pruche et le merisier. A ces arbres s'associent certaines autres essences dominantes à grandes feuilles communes à la région forestière des feuillus, notamment l'érable à sucre, l'érable rouge, le chêne rouge, le bois blanc et l'orme blanc. On trouve également le cèdre blanc, le grand tremble et, en nombre plus restreint, le hêtre américain, le chêne blanc, le noyer tendre et le frêne blanc. Les essences boréales telles que l'épinette blanche, l'épinette noire, le sapin baumier, le pin gris, le peuplier et le bouleau à papier s'entremêlent, et l'épinette rouge abonde dans certaines zones centrales et orientales. Cette région s'étend vers l'ouest jusque dans le sud-est du Manitoba, mais elle ne comprend pas la zone située au nord du lac Supérieur.

Région forestière subalpine. Forêt de résineux croissant dans les régions montagneuses de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, elle s'étend de la chaîne des Rocheuses vers l'intérieur de la Colombie-Britannique jusqu'aux inlets de la côte du Pacifique. Les espèces caractéristiques sont l'épinette d'Engelmann, le sapin de l'Ouest et le pin lodgepole. Il existe une relation étroite entre la forêt subalpine et la forêt boréale: dans l'une comme dans l'autre on rencontre l'épinette noire, l'épinette blanche et le tremble. On constate aussi la présence du sapin de Douglas de la forêt montagnarde, ainsi que de la pruche de l'Ouest, du cèdre de l'Ouest et du sapin amabilis de la forêt côtière. Les autres essences sont le mélèze de l'Ouest, le pin albicaule, le pin souple et, dans les montagnes côtières, le cyprès jaune et la pruche de Mertens.

Région forestière montagnarde. Cette région occupe une grande section des plateaux intérieurs de la Colombie-Britannique ainsi qu'une partie de la vallée de la Kootenay et une petite surface sur le versant oriental des Rocheuses. C'est le prolongement