


Graphique 3.1

Tendances de l'espérance de vie et de la mortalité infantile, 1931-81



(1) Décès pour 1,000 naissances vivantes.

de la population enquêtée a déclaré avoir au moins un problème de santé. Les personnes âgées souffraient d'un plus grand nombre d'atteintes diverses et, par rapport aux hommes, les femmes ont déclaré plus de problèmes sanitaires (tableau 3.7).

3.1.4 Problèmes de santé particuliers

Les désordres mentaux sont traités soit dans des établissements spécialisés, soit dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, et en 1979-80 cette catégorie de maladies figurait pour 8.7 % de toutes les journées d'hospitalisation. Même si le rôle des hôpitaux généraux dans le traitement des maladies mentales est souvent méconnu, ces hôpitaux accueillent presque autant de malades mentaux (comptés en journées d'hospitalisation) que les établissements psychiatriques proprement dits. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être traitées dans des hôpitaux généraux, notamment pour ce qui est des névroses et des troubles de la personnalité.

Les névroses représentent 7.8 % des journées d'hospitalisation de personnes ayant des troubles psychiques. La schizophrénie suit de près au deuxième rang, avec 28.5 %, tandis que les psychoses arrivent au troisième rang avec 17.6 %. La moitié des journées d'hospitalisation pour névroses et le tiers pour psychoses sont passées dans des hôpitaux généraux, et 90 % environ des journées d'hospitalisation pour

schizophrénie, dans des établissements psychiatriques. Les hôpitaux généraux n'absorbent qu'une faible proportion des journées d'hospitalisation pour arriération mentale.

Dans le cas des femmes, les deux principales causes d'hospitalisation pour troubles psychiques sont la schizophrénie et l'arriération mentale. Ce sont les hommes qui comptent le plus grand nombre de journées d'hospitalisation pour schizophrénie et, dans une moindre mesure, pour arriération mentale et psychoses. Cette donnée contraste avec le chiffre des entrées à l'hôpital pour alcoolisme comme cause la plus importante d'hospitalisation dans le domaine de la psychopathologie.

La cardiopathie a été la cause d'un décès sur trois en 1978. Au cours de la première décennie, les taux de décès par maladie du cœur ont régressé peu à peu. L'Enquête Santé Canada révèle qu'environ 800,000 Canadiens ont eu des problèmes cardiaques en 1979; plus de la moitié de ces personnes étaient en âge de travailler. On a estimé que les maladies du cœur ont contraint 300,000 personnes à restreindre leurs activités quotidiennes et plus de 100,000 personnes à subir des journées d'invalidité. Plus de 200,000 patients ayant quitté l'hôpital en 1978 y avaient été traités pour une forme ou l'autre de cardiopathie.

Le cancer a été la cause de plus d'un décès sur cinq; 40 % des cancéreux et cancéreuses qui sont décédés