



Graphique 3.1

Tendances de l'espérance de vie et de la mortalité infantile



observées dans l'incidence des décès attribuables aux accidents et aux maladies cardio-vasculaires.

Parmi les principales causes de décès, seul le cancer a été la cause d'une augmentation du taux de mortalité au cours de la période allant de 1976 à 1986, soit d'environ 7 % chez les hommes et les femmes. Dans cette catégorie, on a observé une forte augmentation du taux de mortalité attribuable au cancer du poumon chez les femmes, qui a presque doublé entre 1976 et 1986.

L'analyse des principales causes de décès selon le groupe d'âge pour 1986 indique que, chez les moins de 45 ans, les accidents représentaient de loin la plus importante cause. Cela était particulièrement vrai chez les hommes, car, dans le groupe d'âge des 5 à 19 ans, les personnes de sexe masculin étaient deux fois plus susceptibles de mourir dans un accident que les personnes de sexe féminin; et dans le groupe d'âge des 20 à 44 ans, le taux de décès attribuable à des accidents était presque quatre fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Le cancer était la principale cause de décès chez les femmes âgées de 20 à 44 ans en 1986, le taux chez celles-ci étant légèrement supérieur à celui observé chez les hommes. Les suicides constituaient l'une des principales causes de décès chez les hommes et les femmes âgés de moins de 45 ans en 1986, mais ils sont plus fré-

quents chez les hommes. Dans le groupe d'âge des 20 à 44 ans, par exemple, le suicide venait en deuxième position parmi les causes de décès chez les hommes et en troisième chez les femmes; cependant, le taux de suicide chez les hommes, à 30,9 pour 100 000 habitants, était plus de quatre fois supérieur à celui des femmes (7,7).

Dans le groupe d'âge des 45 à 64 ans, ce sont le cancer et les maladies cardio-vasculaires qui ont causé le plus grand nombre de décès tant chez les hommes que chez les femmes en 1986; cependant, le taux de mortalité attribuable aux maladies cardio-vasculaires chez les hommes était plus de trois fois supérieur à celui observé chez les femmes.

Dans le groupe d'âge des 65 ans ou plus, en 1986, ce sont les maladies de cœur qui constituaient, et de loin, la principale cause de décès tant chez les hommes que chez les femmes, suivies du cancer. Les maladies respiratoires et cérébro-vasculaires (apoplexies) étaient également d'importantes causes de décès dans ce groupe d'âge.

Le nombre d'années potentielles de vie perdues (APVP) est un indicateur utile du nombre des décès prématurés. Il permet d'appliquer un plus fort coefficient de pondération aux décès qui