

107. La proportion des décès causés par les maladies zymotiques, ou spécialement des maladies qui peuvent être prévenues, au nombre total de décès était de 23.71 par cent, ou près d'un quart, et la proportion à la population, était de 0.55 par cent ou 5.53 par 1,000 âmes. Le tableau suivant indique comment elles sont réparties dans les villes où les statistiques mortuaires sont recueillies. Les chiffres donnés pour la ville de Londres en 1887, font voir jusqu'à quel point ces maladies peuvent être diminuées en prenant les mesures sanitaires nécessaires. Le nombre de décès causés par la fièvre typhoïde, n'était que de 0.14 par cent, et celui des décès causés par les maladies zymotiques de 0.33 par cent, ou de 3.30 par 1000 âmes et de 17.27 en proportion du nombre total de décès.

Décès
causés
par les
maladies
zymo-
tiques.

DÉCÈS CAUSÉS PAR LES MALADIES ZYMOTIQUES, 1887.

VILLES.	Maladies zymotiques.	VILLES.	Maladies zymotiques.
Montréal.....	1,592	Sherbrooke.....	61
Toronto.....	607	Peterboro'.....	38
Québec.....	353	Frédéricton.....	28
Hamilton.....	136	St-Hyacinthe.....	17
Halifax.....	87	Galt.....	28
Winnipeg.....	230	Hull.....	136
Ottawa.....	239	London.....	83
St-Jean, N.B.....	85	Brantford.....	56
Kingston.....	25	Victoria, C.B.....	33
St-Thomas.....	44	Trois-Rivières.....	35
Charlottetown.....	40	Woodstock.....	45
Guelph.....	31	Sorel.....	74
Belleville.....	28		
Chatham.....	24	Total.....	4,155

108. Les chiffres du tableau suivant ont été pris dans les relevés de la statistique mortuaire et donne la proportion des décès dans six des principales villes de la Puissance

Proportion des
décès dans
six des
principales
villes du
Canada