

136. Il y a eu une diminution de 401 dans le nombre de décès attribués aux maladies zymotiques, ce qui est une preuve évidente que, comme ces maladies peuvent être prévenues, on porte plus d'attention aux mesures sanitaires et il est à espérer que chaque année verra diminuer la mortalité causée par ces maladies. La proportion de cette classe de décès à la mortalité totale était de 20·12 par cent comparée avec 22 par cent en 1888 et 23·71 par cent en 1887. La proportion des décès à la population était de 4·14 par 1,000 âmes; en 1888 elle était de 4·88 par 1,000. Le fait que la proportion des décès à Londres provenant des maladies zymotiques n'était que de 4·2 par 1,000 âmes, en 1888, fait voir clairement ce qui peut être accompli en donnant une attention soutenue aux mesures sanitaires. Le tableau suivant indique comment elles sont réparties dans les villes où les statistiques mortuaires sont recueillies.

Décès causés par les maladies zymotiques.

## DÉCÈS CAUSÉS PAR LES MALADIES ZYMOTIQUES, 1889.

VILLES.	Maladies zymotiques.	VILLES.	Maladies zymotiques.
Montréal . . . . .	1,378	Hull . . . . .	39
Québec . . . . .	415	Frédéricton . . . . .	38
Toronto . . . . .	357	Victoria, C.-B. . . . .	37
Ottawa . . . . .	226	Chatham . . . . .	35
Winnipeg . . . . .	186	Kingston . . . . .	35
Saint-Jean, N.-B. . . . .	151	Woodstock . . . . .	29
Halifax . . . . .	130	Belleville . . . . .	26
Hamilton . . . . .	108	Guelph . . . . .	26
Sorel . . . . .	62	Saint-Jean, Que. . . . .	24
Trois-Rivières . . . . .	58	Saint-Thomas . . . . .	19
Charlottetown . . . . .	58	Windsor . . . . .	18
Brantford . . . . .	53	Galt . . . . .	8
London . . . . .	52	Peterborough . . . . .	8
Sherbrooke . . . . .	49		
Saint-Hyacinthe . . . . .	45	Total . . . . .	3,670

137. Le tableau suivant indique de quelle manière les causes des décès dans les villes nommées ont été réparties entre les

Causes des décès dans les différentes cités.