

35.—Mortalité puerpérale dans chaque province, par causes de décès, 1930.

NOTA.—Les totaux de 1929 et des années précédentes sont contenues dans le tableau 34.

Groupes d'âges.	I.P.É.	N.-É.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada. ¹
Accidents de la grossesse—total.	-	9	3	23	28	2	8	10	6	89
(a) Avortement.	-	3	1	8	3	1	3	6	1	26
(b) Grossesse ectopique.	-	3	1	10	17	1	2	3	3	40
(c) Autres accid. de la grossesse	-	2	1	5	7	-	3	1	1	20
(d) Avort. prov. par soi-même.	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
Hémorragie puerpérale.	2	8	3	80	39	7	16	13	11	179
Autres accid. de l'accouch., total.	-	7	8	39	52	13	10	4	5	138
(a) opération césarienne.	-	3	1	5	14	4	4	-	2	33
(b) Accouchement laborieux.	-	1	1	8	11	3	2	2	1	29
(c) Autres opér. chirurgicales et accouchem. instrumental.	-	2	3	9	3	5	2	1	2	27
(d) Vomissements.	-	1	1	15	10	1	-	1	-	29
(e) Rupture de l'utérus, etc.	-	-	2	2	14	-	2	-	-	20
Septicémie puerpérale.	1	21	19	170	153	28	43	48	18	501
Phlegmasia alba dolens; embolie puerpérale ou mort durant l'enfantement.	2	10	8	37	42	6	12	19	7	143
Albuminurie et éclampsie puerpérale.	-	19	11	95	113	18	20	15	14	305
Suites de l'accouchement (non autrement définies).	-	2	5	19	13	1	3	5	2	50
Maladies puerpérales du sein.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaux.	5	76	57	463	440	75	112	114	63	1,405

Comparativement à 1929, la mortalité puerpérale a augmenté de 68, ou 5.1 p.c. en 1930. Les provinces qui fournissent ces augmentations sont la Nouvelle-Ecosse, le Québec, l'Ontario et la Colombie Britannique, et les principales causes attribuées à ces augmentations sont la septicémie, l'albuminurie, l'éclampsie, et l'embolie puerpérales, et la mort subite.