## 24.—Principales causes de décès au Canada, 1928-33.

N° de la liste inter- nationale.1	Enumération.	1928.	1929.	1930.	1931.	1932.	1933.
1, 2	Fièvre typhoïde	467	467	451	421	339	291
7	Rougeole	337	619	521	167	330	170
8	Scarlatine	346	440	397	253	197	157
	Coqueluche	727	755	964	748	555	552
10	Diphtérie	916	980	737	646	398	239
11	Influenza <sup>2</sup>	4,703	7,170	2,472	3,217	4,236	4,019
16	Poliomyélite aiguë et polioencéphalite	100	170	245	000	101	=0
17	aigue	182	152	215	223 77	164	73
	Encéphalite léthargique ou épidémique.	120	118	88		76	58
18 23	Méningite cérébrospinale ou épidémique.	235 6,490	341 6,443	294 6,581	6,204	139 5,870	109 5.664
24-32	Tuberculose de l'appareil respiratoire <sup>2</sup> Tuberculose d'autres organes	1,370	1,329	1,494	1,412	1,296	1,275
45-53	Cancer	8,514	8,792	9.273	9,578	10,024	10,653
45-55 59	Diabète sucré	1.097	1.208	1.146	1.244	1,343	1.287
	A námice	732	693	740	716	728	736
82 a. b. c	Anémies Hémorragie cérébrale, embolie ou throm-	102	050	170	, ,,,	120	100
02 4, 0, 0	bose cérébrale	3.094	2,986	2,827	2,594	2.5,3	2,639
82d	Paralysies non spécifiées.	1 011	984	907	728	654	559
86	Convulsions chez les enfants de moins de				1.20		-
	cing ans	440	429	380	368	304	263
90-95	cinq ans	12,630	13,205	13,067	13,731	15,328	15,485
96, 97	Maladia des estamo	5,644	5,940	6.560	5,9573	6,798	6,950
99, 102						2000000	,
106	Bronchite	522	471	443	469	437	367
107-109	Pneumonie	8,425	8,441	7,338	7.011	7,045	6,487
119-120	Diarrhée et entérite2	5,032	4,910	6,013	5,158	3,735	3,395
121	Appendicite		1,451	1,488	1,394	1,454	1,455
122 130-132	Hernie, obstruction intestinale	856	962	963	987	947	1,029
130-132	NéphritesMaladies de la prostate <sup>2</sup>	5,715 785	5,687 739	5,570 801	5,168 746	5,635 879	5,516 926
	Causes puerpérales	1.331	1,341	1,405	1.215	1.121	1.111
140-150	Vices de conformation congénitaux	1,331	1.466	1,405	1.427	1.349	1.374
	Maladies du premier âge <sup>2</sup>	9.215	9.144	8,974	9,019	7,932	7.337
162	Sénilité	2,408	2.505	2.334	2,225	2.192	2.037
163-171	Suicides	751	835	1.010	1.004	1.024	922
173-198	Morts violentes (suicide excepté)	6.174	6.316	6,468	6,168	5,621	5,294
	Autres causes spécifiées²	14,791	15,020	14,919	12,9143	12,617	12,546
	Totaux, causes spécifiées	107,906	112,339	108,315	103,417	103,370	100,975
199, 200	Causes de décès indéterminées	1,151	1,176	991	1,100	1,007	993
	Grands totaux	109,057	113,515	109,306	104,517	104,377	101,968

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les numéros figurant dans cette colonne sont ceux de la nomenclature internationale des causes de décès revisée en 1929 par la Commission Internationale chargée de la confection des nomenclatures nosologiques et de la classification des causes de décès. Les nomenclatures, soit telles quelles, soit en forme intermédiaire ou abrégée sont acceptées par la presque totalité des pays civilisés.

<sup>2</sup> Pour ces causes de décès la comparabilité entre les chiffres de 1928-30 et ceux de 1931-33 n'est pas exacte à le mits de chargements dans la classification.

à la suite de changements dans la classification.

Revisé depuis la publication de l'Annuaire 1933.

## 25.-Mortalité par 100,000 habitants au Canada, par causes principales, 1928-33.

N° de la liste inter- nationale. <sup>1</sup>	Enumération.	1928.	1929.	1930.	1931.	1932.	1933.
1, 2	Fièvre typhoïde	5 3	5	4	4	3	3
7	Rougeole	3	6	5	2	3	2
8	Scarlatine	4	4	4	2	2	1
9	Coqueluche.	7	8	9	7	5	5
10	Diphterie	9	10	7	6	4	2
11	Influenza <sup>2</sup>	48	72	24	31	40	38
	aigue	2	2	9	9	2	1
17	Encephalite léthargique ou épidémique.	ร์ไ	í	ĩ	ī	í	ì
18	Méningite cérébrospinale ou épidémique	2	3	3	2	î	î
23	Tuberculose de l'appareil respiratoire2 1	66	64	65	60	56	53
24-32	Tuberculose d'autres organes	14	13	15	14	12	12
		87	88	91	92	96	100
59	Diabète sucré	ĭi	12	ïì	12	13	12
71	I Anemies	7 1	7	17	7	7	7
82 a, b, c	Hémorragie cérébrale, embolie ou throm-			•			
	bose cérébrale	32	30	28	25	24	25
82d	Paralysies non spécifiées	10	10	-ğ	7	6	25 5