18.—Taux brut et taux standardisé de mortalité au Canada, par province, 1935-40, et moyenne quinquennale, 1921-40

Province	Moyennes				1935	1936	1937	1938	1939	1940
	1921-25	1926-30	1931-35	1936-40						
Ile du Prince-Edouard—										
Taux brut	12·5	11·0	11·3	11·5	11·0	11·1	12·3	11·0	11·9	11·4
Taux standardisé	9·3	8·1	7·9	[1]	7·6	7·6	8·4	7·4	[1]	[1]
Nouvelle-Ecosse—										
Taux brut	12·6	12·4	11·7	11·2	11·7	11·0	11·2	11·1	11·4	11·1
Taux standardisé	10·4	10·0	9·1	[1]	9·0	8·4	8·5	8·4	[1]	[1]
Nouveau-Brunswick—										
Taux brut	13·1	12·5	11·2	11·3	11·1	11·0	12·3	11·0	11·3	11·0
Taux standardisé	11·5	10·9	9·6	[1]	9·4	9·3	10·4	9·2	[1]	[1]
Québec—										
Taux brut	[2]	13·5	11·1	10·5	10·7	10·3	11·3	11·3	10·4	10·1
Taux standardisé	[2]	13·1	10·8	[1]	10·4	10·1	11·1	10·1	[1]	[1]
Ontario—										
Taux brut	11·3	11·2	10·1	10·1	9·9	10·2	10·4	9·9	10·0	10·2
Taux standardisé	10·3	9·8	8·5	[1]	8·1	8·3	8·4	7·9	[1]	[1]
Manitoba—										
Taux brut	8·6	8·3	7·6	8·5	8·1	8·7	8·5	8·2	8·5	8·7
Taux standardisé	9·4	8·8	7·6	[1]	7·8	8·4	8·1	7·6	[1]	[1]
Saskatchewan—										
Taux brut	7·5	7·3	6·5	6·8	6·6	6·8	7·4	6·5	6·4	7·0
Taux standardisé	8·5	8·2	7·1	[1]	6·9	7·1	7·7	6·6	[1]	[1]
Alberta—										
Taux brut	8·3	8·4	7·3	7·7	7·5	8·0	8·0	7·5	7·3	7·9
Taux standardisé	9·5	9·4	7·8	[1]	7·7	8·2	8·3	7·5	[1]	[1]
Colombie Britannique—										
Taux brut	8·7	9·3	8·9	10·0	9·3	9·6	10·6	9·8	9·7	10·5
Taux standardisé	9·0	8·9	8·0	[1]	8·1	8·2	8·9	8·1	[1]	[1]
Canada (à l'exclusion des Territoires)—										
Taux brut	[2]	**11·1**	**9·7**	**9·7**	**9·7**	**9·7**	**10·2**	**9·5**	**9·6**	**9·8**
Taux standardisé	[2]	**10·5**	**9·1**	[1]	**9·0**	**9·0**	**9·5**	**8·8**	–	–

[1] Les données après les années 1938 sont sujettes à une grande marge d'erreur et n'ont pas été calculées.
[2] Avant 1926 le Québec ne faisait pas partie du territoire d'enregistrement.

Causes de décès.—Près de 87 p.c. des décès déclarés de 1936 à 1940 sont attribuables aux 32 causes spécifiées dans les tableaux **19** et **20.** Dans ces tableaux les groupements sont conformes à la liste internationale telle que revisée en 1929. Cette revision a été appliquée pour la première fois aux statistiques canadiennes de mortalité en 1931. Chaque revision de la liste internationale présente des difficultés spéciales quand il s'agit de garder la continuité.

Dans toute analyse de l'importance relative des causes de décès on doit tenir compte des effets du vieillissement de la population canadienne. Ces effets sont brièvement décrits aux pp. 91-92 de l'Annuaire de 1941.

19.—Principales causes de décès au Canada, 1936-40

N° de la liste internationale[1]	Nomenclature	1936	1937	1938	1939	1940
1, 2	Fièvre typhoïde	256	330	207	180	224
7	Rougeole	376	837	250	197	168
8	Scarlatine	244	269	202	167	125
9	Coqueluche	594	763	496	541	628
10	Diphtérie	258	369	434	336	213
11	Influenza	3,113	5,260	2,362	3,955	2,789
16	Poliomyélite et polioencéphalite aiguës	97	200	83	56	48
17	Encéphalite léthargique ou épidémique	52	50	45	47	63
18	Méningite cérébrospinale épidémique	103	93	86	84	100
23	Tuberculose de l'appareil respiratoire	5,528	5,497	5,057	4,944	4,643
24-32	Tuberculose d'autres organes	1,235	1,172	1,069	1,033	1,146
45-53	Cancer	11,694	11,963	12,038	12,399	13,322
59	Diabète sucré	1,442	1,555	1,545	1,712	1,787
71	Anémie	646	623	650	699	616

Voir renvoi à la fin du tableau, p. 136.