

Causes de décès.—Près de 89 p.c. des décès enregistrés au Canada au cours des années 1940-42 sont dus à 28 causes spécifiées dont la nomenclature se trouve au tableau 18. Dans ce tableau, les groupements concordent avec les révisions des listes internationales en 1929 et 1938. Ces révisions furent d'abord appliquées aux statistiques vitales canadiennes, pour les années 1931 et 1941 respectivement. Chaque révision de la liste internationale complique le maintien de la continuité. Les chiffres ont été ajustés pour fins de comparaison. Dans toute analyse de l'importance relative des causes de décès, les conséquences du vieillissement de la population canadienne doivent être considérées. Ces conséquences sont exposées brièvement aux pages 91-92 de l'Annuaire de 1941.

18.—Décès et mortalité par 100,000 âmes au Canada, par principales causes, 1940-42

NOTA.—Les statistiques de 1941 et 1942 ne se comparent pas entièrement à celles des années précédentes, à cause des différents modes de répartition, occasionnés par les nouvelles classifications et la nouvelle disposition des rubriques, recommandés dans la cinquième révision de la liste internationale des causes de décès.

No de la liste internationale ¹	Cause de décès	Décès			Mortalité par 100,000 âmes		
		1940	1941	1942	1940	1941	1942
1, 2	Fièvre typhoïde, y compris la paratyphoïde.....	224	165	108	2.0	1.4	0.9
8	Scarlatine.....	125	117	129	1.1	1.0	1.1
9	Coqueluche.....	628	437	560	5.5	3.8	4.8
10	Diphtérie.....	213	240	256	1.9	2.1	2.2
13	Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	4,643	5,002	4,947	40.9	43.5	42.5
14-22	Tuberculose d'autres organes.....	1,146	1,070	1,033	10.1	9.3	8.9
33	Influenza.....	2,789	2,411	1,227	24.5	21.0	10.5
35	Rougeole.....	168	325	131	1.5	2.8	1.1
45-55	Cancer et autres tumeurs malignes.....	13,322	13,417	13,654	117.2	116.8	117.3
61	Diabète sucré.....	1,787	2,140	2,242	15.7	18.6	19.3
73	Anémies.....	616	408	354	5.4	3.6	3.0
83	Lésions intracrâniennes d'origine vasculaire.....	2,296	9,034	8,728	20.2	78.6	75.0
86	Convulsions (moins de 5 ans).....	192	199	195	1.7	1.7	1.7
90-95	Maladies du cœur.....	20,278	26,602	27,529	178.4	231.5	236.6
96, 97, 99, 102	Maladies des artères.....	11,742	2,266	2,270	103.3	19.7	19.5
106	Bronchite.....	331	394	383	2.9	3.4	3.3
107-109	Pneumonie.....	6,132	5,955	5,778	54.0	51.8	49.7
119, 120	Diarrhée et entérite.....	1,891	2,319	2,400	16.6	20.2	20.6
121	Appendicite.....	1,103	1,051	824	9.7	9.1	7.1
122	Hernie, obstruction intestinale.....	991	908	912	8.7	7.9	7.8
130-132	Néphrite.....	6,835	7,399	7,233	60.1	64.4	62.2
137	Maladies de la prostate.....	1,241	892	855	10.9	7.8	7.3
140-150	Causes puerpérales.....	978	901	818	8.6	7.8	7.0
157	Vices de conformation congénitaux.....	1,626	1,901	2,096	14.3	16.5	18.0
158-161	Maladies particulières à la première année de vie.....	6,318	6,252	6,029	55.6	54.4	51.8
162	Sénilité.....	1,555	1,593	1,650	13.7	13.9	14.2
163, 164	Suicides.....	948	896	839	8.3	7.8	7.2
166-198	Morts violentes (suicides exceptés).....	6,470	7,546	7,332	56.9	65.7	63.0
	Autres causes spécifiées.....	13,705	11,862	11,493	120.6	102.4	98.8
	Totaux, causes spécifiées.....	110,293	113,601	112,005	970.5	988.7	962.5
199-200	Causes non spécifiées ou mal définies.....	634	1,038	978	5.6	9.0	8.4
	Totaux, toutes causes.....	110,927	114,639	112,973	976.1	997.8	970.9

¹ Les numéros figurant dans cette colonne sont ceux de la nomenclature internationale des causes de décès, révisée en 1938 par la Commission internationale de classification des maladies et causes de décès. Cette classification, dans sa forme détaillée, intermédiaire ou abrégée, est acceptée par presque tous les pays civilisés.

Mortalité dans les villes canadiennes et centres incorporés.—La proportion des décès, dans les villes du Canada énumérées au tableau 19, demeure assez constante, à environ 1 p.c., durant la période 1926-40. Sur la base des décès de résidents, par rapport à la population résidente, les années individuelles données indiquent une proportion de 1 p.c. de l'ensemble des décès.