

22.—Mortalité infantile et proportion par 100,000 naissances vivantes, par principales causes, 1941 et 1942, et moyennes quinquennales, 1931-40

N° de la liste internationale	Cause de décès	Année	Nombre			Taux par 100,000 naissances vivantes			Répartition proportionnelle par cause de décès
			Sexe masc.	Sexe féminin	Total	Sexe masc.	Sexe féminin	Total	
	Maladies contagieuses ¹	Moy., 1931-35	916	780	1,696	782	701	743	9.9
		Moy., 1936-40	859	698	1,557	731	627	681	10.6
		1941	857	697	1,554	653	561	609	10.2
		1942	611	541	1,152	435	411	423	7.9
86	Convulsions.....	Moy., 1931-35	132	86	218	113	77	95	1.3
		Moy., 1936-40	90	57	147	77	51	64	1.0
		1941	80	62	142	61	50	56	0.9
		1942	87	62	149	62	47	55	1.0
106-109	Bronchite et pneumonie.....	Moy., 1931-35	1,121	852	1,973	957	766	864	11.5
		Moy., 1936-40	1,080	810	1,890	920	728	826	12.9
		1941	1,274	966	2,240	971	778	877	14.7
		1942	1,220	895	2,115	868	679	777	14.4
119	Diarrhée et entérite.....	Moy., 1931-35	1,631	1,171	2,802	1,392	1,053	1,227	16.4
		Moy., 1936-40	1,047	767	1,814	892	689	793	12.3
		1941	998	695	1,693	761	560	663	11.1
		1942	1,006	745	1,751	716	566	643	12.0
157	Vices de conformation congénitaux.....	Moy., 1931-35	691	567	1,258	590	510	551	7.4
		Moy., 1936-40	720	599	1,319	613	538	577	9.0
		1941	902	779	1,681	688	628	658	11.0
		1942	944	852	1,796	671	647	660	12.3
158	Débilité congénitale.....	Moy., 1931-35	866	624	1,490	739	561	653	8.7
		Moy., 1936-40	644	464	1,108	548	417	484	7.5
		1941	629	417	1,046	480	336	410	6.9
		1942	570	394	964	405	299	354	6.6
159	Naissance prématurée.....	Moy., 1931-35	2,147	1,614	3,761	1,833	1,451	1,647	22.0
		Moy., 1936-40	1,859	1,425	3,284	1,583	1,280	1,436	22.3
		1941	1,758	1,251	3,009	1,340	1,008	1,179	19.7
		1942	1,655	1,189	2,844	1,177	903	1,044	19.4
160	Conséquences de l'accouchement.....	Moy., 1931-35	648	383	1,031	553	344	451	6.0
		Moy., 1936-40	571	350	921	486	314	403	6.3
		1941	781	467	1,248	595	376	489	8.2
		1942	784	455	1,239	558	345	455	8.5
161	Autres maladies particulières à la première année de vie.....	Moy., 1931-35	774	564	1,338	661	507	586	7.8
		Moy., 1936-40	668	487	1,155	569	437	505	7.9
		1941	572	377	949	436	304	372	6.2
		1942	567	415	982	403	315	361	6.7
	Autres causes spécifiées.....	Moy., 1931-35	799	576	1,375	682	518	602	8.0
		Moy., 1936-40	758	570	1,328	645	512	581	9.0
		1941	731	563	1,294	557	454	507	8.5
		1942	727	531	1,258	517	403	462	8.6
199,200	Causes non spécifiées ou mal définies.....	Moy., 1931-35	87	71	158	74	64	69	0.9
		Moy., 1936-40	101	78	179	86	70	78	1.2
		1941	206	174	380	157	140	149	2.5
		1942	221	180	401	157	137	147	2.7
	Toutes causes.....	Moy., 1931-35	9,813	7,288	17,101	8,377	6,553	7,489	100.0
		Moy., 1936-40	8,397	6,305	14,702	7,150	5,663	6,427	100.0
		1941	8,788	6,448	15,236	6,699	5,194	5,957	100.0
		1942	8,392	6,259	14,651	5,969	4,751	5,350	100.0

¹ Y compris la rougeole, la scarlatine, la coqueluche, la diphtérie, l'influenza, l'érysipèle, la poliomyélite et la polioencéphalite aiguës, la méningite cérébrospinale, la tuberculose et la syphilis.