

## Sous-section 2.—Mortalité infantile

En ces dernières années, les efforts accomplis pour réduire la mortalité en général ont été consacrés en bonne partie et avec beaucoup de succès à la lutte contre la mortalité infantile. Les services d'hygiène, tant fédéraux que provinciaux et municipaux, et les agences privées de bien-être ont tous lutté énergiquement pour faire diminuer la mortalité infantile, et les statistiques de 1921 à 1943 accusent une amélioration assez constante d'année en année. En réalité, les fluctuations de la tendance générale à la diminution sont dues aux épidémies. En 1921, la mortalité infantile était de 102 par 1,000 naissances vivantes au Canada. Les statistiques de 1942 et de 1943 indiquent la plus faible mortalité depuis l'établissement du territoire d'enregistrement, soit 54 par 1,000 naissances vivantes. Le Nouveau-Brunswick a le taux le plus élevé; le Québec vient en deuxième et la Nouvelle-Écosse en troisième lieu. En d'autres termes, plus de 13,000 jeunes Canadiens ont été ajoutés à la population canadienne en 1942 et en 1943 qui, dans les conditions existant en 1921, seraient morts avant leur premier anniversaire.

## 22.—Mortalité infantile et proportion par 1,000 naissances vivantes, par province, 1941-43, et moyennes quinquennales, 1921-40

NOTA.—Les chiffres pour chaque année, de 1921 à 1940, se trouvent dans les éditions précédentes de l'Annuaire, commençant avec l'édition de 1931.

Année	I.P.-E.	N.-E.	N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	C.B.	Canada <sup>1</sup>
<b>MORTALITÉ INFANTILE</b>										
Moyennes, 1921-25.....	152	1,139	1,164	<sup>2</sup>	5,916	1,394	1,790	1,327	621	<sup>2</sup>
Moyennes, 1926-30.....	122	934	1,040	10,518	5,091	1,031	1,560	1,195	571	22,063
Moyennes, 1931-35.....	131	840	857	7,757	3,962	835	1,260	997	463	17,101
Moyennes, 1936-40.....	142	782	913	6,470	3,196	773	1,025	869	532	14,701
1941.....	163	908	936	6,770	3,294	788	946	879	552	15,236
1942.....	106	884	978	6,657	3,139	807	788	696	596	14,651
1943.....	98	898	886	6,642	3,390	909	873	810	711	15,217
<b>MORTALITÉ INFANTILE PAR 1,000 NAISSANCES VIVANTES</b>										
Moyennes, 1921-25.....	77	94	105	<sup>2</sup>	83	84	83	86	61	<sup>2</sup>
Moyennes, 1926-30.....	70	85	101	127	74	72	73	75	55	93
Moyennes, 1931-35.....	67	73	82	98	61	61	62	60	46	75
Moyennes, 1936-40.....	69	65	82	82	50	57	55	53	44	64
1941.....	80	65	76	76	46	53	51	51	37	60
1942.....	50	58	77	70	40	51	43	38	35	54
1943.....	45	58	68	67	42	55	47	42	38	54

<sup>1</sup> Moins les Territoires.

<sup>2</sup> Avant 1926 le Québec ne faisait pas partie du territoire d'enregistrement.

**Mortalité infantile par cause.**—Neuf principales causes de décès ont contribué de 92 à 89 p.c. à la mortalité infantile au Canada, de 1931 à 1943. Elles sont données au tableau 23 et il est à remarquer que quatre causes, dont la source remonte à la naissance: naissance prématurée, conséquences de l'accouchement, débilité congénitale et vices de conformation congénitaux contribuent pour plus de 46 et de 49 p.c. à la mortalité infantile en 1942 et 1943 respectivement. Le pourcentage était de 41 en 1926 et de 42 en 1930; mais la mortalité infantile, depuis lors, a diminué de plus de 18 p.c. dans l'intervalle de 1936 à 1943. La diminution de la mortalité infantile est une indication du progrès de l'hygiène prénatale, intranatale et postnatale.