

13.—Décès et mortalité pour 100,000 habitants, selon la Liste abrégée internationale de 50 causes, 1957 et 1958 (fin)

N° de la Liste internationale		Cause de décès	Décès		Taux pour 100,000 habitants	
Liste abrégée	Liste détaillée		1957	1958	1957	1958
B32	500-502	Bronchite.....	772	854	4.7	5.0
B33	540, 541	Ulcère de l'estomac et du duodénum.....	797	856	4.8	5.0
B34	550-553	Appendicite.....	184	191	1.1	1.1
B35	560, 561, 570	Occlusion intestinale et hernie.....	763	860	4.6	5.0
B36	543, 571, 572	Gastrite, duodénite, gastro-entérite et colite, sauf la diarrhée chez le nouveau-né.....	869	1,070	5.2	6.3
B37	581	Cirrhose du foie.....	969	965	5.8	5.7
B38	590-594	Néphrite et néphrose.....	2,020	1,844	12.2	10.8
B39	610	Hypertrophie de la prostate.....	517	554	3.1	3.2
B40	640-652, 660, 670-689	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.....	255	263	1.5	1.5
B41	750-759	Malformations congénitales.....	2,779	2,830	16.8	16.6
B42	760-762	Lésions obstétricales, asphyxie et atelectasie post-natales.....	3,232	2,931	19.5	17.2
B43	763-768	Infections de nouveau-né.....	798	710	4.8	4.2
B44	769-776	Autres maladies particulières à la première enfance et débilite non spécifiée.....	3,951	3,923	23.8	23.0
B45	780-795	Sénilité, sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues.....	1,700	1,526	10.2	9.0
B46	Reliquat	Toutes autres maladies.....	10,685	10,448	64.4	61.3
BE47	E810-E835	Accidents d'automobiles.....	3,694	3,517	22.3	20.6
BE48	E800-E802 E840-E962	Tous autres accidents.....	5,961	5,640	35.9	33.1
BE49	E963-E970 E979	Suicide et mutilation volontaire.....	1,247	1,271	7.5	7.5
BE50	E964, E965 E980-E999	Homicide et faits de guerre.....	183	203	1.1	1.2
Total, toutes causes.....			136,579	135,201	823.3	793.1

¹ Moins de 0.1 pour 100,000. ² Comprend la maladie de Hodgkin, la leucémie et l'aleucémie. ³ Sans la maladie de Hodgkin, la leucémie et l'aleucémie.

Sous-section 2.—Mortalité infantile

Le tableau 1, pp. 238-239, et le tableau 14 ci-dessous montrent l'amélioration marquée de la mortalité infantile depuis un quart de siècle. Bien que 70,912 des 2,269,085 enfants nés en 1954-1958 n'aient pas vécu un an, 142,382 qui seraient morts au taux de 1926-1930 ont survécu.

Le tableau 14 montre que la mortalité infantile est de 25 à 30 p. 100 plus élevée chez les garçons que chez les filles au Canada; les différences sont encore plus grandes entre les provinces. Dans l'ensemble du pays, sur chaque millier de garçons nés vivants en 1958, 34 n'ont pas vécu un an contre 26 filles par millier. Comme il est dit plus haut, il naît en moyenne 1,057 garçons pour 1,000 filles; cependant, comme la mortalité chez les garçons est plus élevée, l'excédent de garçons est très réduit vers la fin de la première année. Ainsi, en 1956-1958, 714,445 garçons sont nés contre 675,505 filles, soit un excédent de 38,940 ou de 5.8 p. 100; durant la même période, 24,573 garçons sont morts durant leur première année contre 18,521 filles, de sorte que l'excédent de garçons à un an a baissé à 32,878 ou de 5 p. 100.