

13.—Décès et mortalité pour 100,000 habitants, selon la Liste abrégée internationale de 50 causes, 1958 et 1959 (fin)

N° de la Liste internationale		Cause de décès	Décès		Taux pour 100,000 habitants	
Liste abrégée	Liste détaillée		1958	1959	1958	1959
B29	444-447	Hypertension, sans mention du cœur.....	1,162	1,089	6.8	6.2
B30	480-483	Grippe.....	760	1,271	4.5	7.3
B31	490-493	Pneumonie.....	5,190	5,619	30.4	32.2
B32	500-502	Bronchite.....	854	883	5.0	5.1
B33	540, 541	Ulcère de l'estomac et du duodénum.....	856	857	5.0	4.9
B34	550-553	Appendicite.....	191	176	1.1	1.0
B35	560, 561, 570	Occlusion intestinale et hernie.....	860	881	5.0	5.1
B36	543, 571, 572	Gastrite, duodénite, gastro-entérite et colite, sauf la diarrhée chez le nouveau-né.....	1,070	995	6.3	5.7
B37	581	Cirrhose du foie.....	965	1,015	5.7	5.8
B38	590-594	Néphrite et néphrose.....	1,844	1,695	10.8	9.7
B39	610	Hypertrophie de la prostate.....	554	556	3.2	3.2
B40	640-652, 660, 670-689	Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.....	263	263	1.5	1.5
B41	750-759	Malformations congénitales.....	2,830	2,767	16.6	15.9
B42	760-762	Lésions obstétricales, asphyxie et atelectasie post-natales.....	2,931	2,936	17.2	16.8
B43	763-768	Infections de nouveau-né.....	710	623	4.2	3.6
B44	769-776	Autres maladies particulières à la première enfance et débilite non spécifiée.....	3,923	3,894	23.0	22.3
B45	780-795	Sénilité, sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues.....	1,526	1,536	9.0	8.8
B46	Reliquat	Toutes autres maladies.....	10,448	11,019	61.3	63.2
BE47	E810-E835	Accidents d'automobiles.....	3,517	3,687	20.6	21.1
BE48	E800-E802 E840-E962	Tous autres accidents.....	5,640	5,752	33.1	33.0
BE49	E963, E970- E979	Suicide et mutilation volontaire.....	1,271	1,287	7.5	7.4
BE50	E964, E965 E980-E999	Homicide et faits de guerre.....	203	178	1.2	1.0
Total, toutes causes.....			135,201	139,913	793.1	802.2

Sous-section 2.—Mortalité infantile

Le tableau 1, pp. 210-211, et le tableau 14 ci-après montrent l'amélioration marquée de la mortalité infantile depuis un quart de siècle. Bien que 84,507 des 2,748,360 enfants nés en 1954-1959 n'aient pas vécu un an, 173,839 *qui seraient morts* au taux de 1926-1930 ont survécu.

Le tableau 14 montre que la mortalité infantile est de 25 à 30 p. 100 plus élevée chez les garçons que chez les filles au Canada; les différences sont encore plus grandes entre les provinces. Dans l'ensemble du pays, sur chaque millier de garçons nés vivants en 1959, 32 n'ont pas vécu un an contre 25 filles par millier. Comme il est dit plus haut, il naît en moyenne 1,057 garçons pour 1,000 filles; cependant, comme la mortalité chez les garçons est plus élevée, l'excédent de garçons est très réduit vers la fin de la première année. Ainsi, en 1957-1959, 728,821 garçons sont nés contre 689,665 filles, soit un excédent de 39,156 ou de 5.7 p. 100; durant la même période, 24,292 garçons sont morts durant leur première année contre 17,998 filles, de sorte que l'excédent de garçons à un an a baissé à 32,862 ou moins de 5 p. 100.