

La rayonne, la cellophane et plusieurs autres produits de la cellulose étendent rapidement l'emploi du bois. Les besoins croissants de produits plastiques du bois, de panneaux de fibre et de bois laminés permettent d'employer davantage les bois de qualité inférieure et font utiliser plus à fond les ressources forestières et éliminer une bonne partie des pertes.

3.—Utilisation et dégarnissement moyens de la forêt, 1958 et 1959 et moyenne de 1949-1958

Détail	Bois utilisable			Dégarnissement		
	Moyenne, 1949-1958	1958	1959 ^p	Moyenne, 1949-1958	1958	1959 ^p
	(milliers de pieds cubes)			%	%	%
Produits utilisés						
Billes et billots						
Usage domestique.....	1,473,782	1,456,917	1,725,700 ¹	43.1	41.4	54.1 ¹
Exportation.....	8,787	4,704	4,300	0.3	0.1	0.1
Bois à pâte						
Usage domestique.....	1,078,071	975,642	968,400	31.5	27.7	30.3
Exportation.....	164,749	109,337	94,100	4.8	3.1	2.9
Bois de chauffage.....	337,523	261,853	260,000	9.9	7.4	8.2
Autres produits.....	69,270	46,217	44,600	2.0	1.3	1.4
Total, utilisation.....	3,132,182	2,854,670	3,097,100	91.6	81.0	97.0
Pertes						
Causées par les incendies.....	288,027	669,433	94,400	8.4	19.0	3.0
Total, dégarnissement².....	3,420,209	3,524,103	3,191,500	100.0	100.0	100.0

¹ Comprend des billes à pâte.

² Ne comprend pas les pertes dues à des causes autres que l'incendie (insectes, maladie et mortalité naturelle) dont il n'existe aucune estimation sûre. Représente un dégarnissement annuel moyen de 7 pi. cu. par acre dans les forêts productives accessibles; dans les terres boisées, occupées et productives plus accessibles, le taux est beaucoup plus élevé.

