

## 17.—Décès d'enfants et taux pour 100,000 naissances vivantes, par cause, 1959-1961

N° de la Liste internationale	Cause de décès	Nombre de décès			Taux pour 100,000 naissances vivantes		
		1959	1960	1961	1959	1960	1961
001-019	Tuberculose.....	18	7	8			
020-029	Syphilis.....	1	—	1	4	1	2
045-048	Dysenterie.....	9	23	14	—	—	—
050	Scarlatine.....	2	1	1	2	5	3
052	Érysipèle.....	2	—	1	—	—	—
055	Diphthérie.....	—	—	—	—	—	—
056	Coqueluche.....	39	63	24	8	13	5
057	Infections à méningocoques.....	25	35	8	5	7	2
085	Rougeole.....	28	27	30	6	6	6
140-239	Tumeurs.....	53	44	42	11	9	9
273	Maladies du thymus.....	29	23	13	6	5	3
325	Déficience mentale.....	65	52	75	14	11	16
340	Méningite (non méningococcique).....	79	89	109	16	19	23
391, 392	Otite moyenne.....	89	86	59	19	18	12
470-475	Infections aiguës des voies respiratoires.....	59	57	81	12	12	17
480-483	Grippe.....	175	119	108	37	25	23
490-493	Pneumonie (4 semaines et plus).....	1,389	1,415	1,273	290	296	268
500-502	Bronchite.....	105	105	74	22	22	16
543	Gastrite et duodénite.....	2	5	4	—	1	1
560-570	Hernie et occlusion intestinale.....	102	97	107	21	20	22
571	Gastro-entérite et colite.....	490	483	400	102	101	84
572	Entérite chronique et colite ulcéreuse.....	1	5	2	—	1	—
750-759	Malformations congénitales.....	2,149	2,076	2,192	448	434	461
760, 761	Lésions obstétricales.....	1,400	1,265	1,284	292	264	266
762	Asphyxie et atélectasie postnatales.....	1,535	1,522	1,502	320	318	316
763	Pneumonie du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	454	454	410	95	95	86
764	Diarrhée du nouveau-né (moins de 4 semaines).....	126	80	86	26	17	18
765-768	Autres infections du nouveau-né.....	43	48	43	9	10	9
769	Toxémie prénatale.....	121	91	120	25	19	25
770	Erythroblastose.....	377	343	325	79	72	68
771	Maladie hémorragique du nouveau-né.....	107	93	97	22	19	20
772	Déséquilibre alimentaire.....	71	48	53	15	10	11
773	Maladies mal définies particulières à la naissance.....	849	875	972	177	183	204
774-776	Débilité.....	2,369	2,261	2,284	494	472	480
795	Causes mal définies ou inconnues.....	145	96	80	30	20	17
E810-E825	Accidents de la circulation dus à des véhicules automobiles.....	24	14	24	5	3	5
E900-E904	Chutes accidentelles.....	10	17	14	2	4	3
E916	Accidents causés par le feu.....	29	24	23	6	5	5
E921, E922	Pénétration accidentelle de substances alimentaires ou de corps étrangers dans les voies respiratoires.....	303	306	317	63	64	67
E924, E925	Suffocation mécanique accidentelle.....	159	145	178	33	30	37
	Autres morts accidentelles et violentes.....	42	51	64	9	11	13
	Autres causes déterminées.....	520	532	458	108	111	96
	<b>Total, toutes causes.....</b>	<b>13,595</b>	<b>13,077</b>	<b>12,940</b>	<b>2,837</b>	<b>2,733</b>	<b>2,720</b>

**Mortalité infantile dans les agglomérations urbaines.**—La mortalité infantile varie ordinairement beaucoup d'une année à l'autre, dans les différentes cités et villes, à cause du nombre relativement peu élevé des décès d'enfants qui y surviennent. Comme le montre le tableau 2 (pp. 229-233), plusieurs villes, toutefois, conservent constamment une mortalité infantile très faible en comparaison de celle du pays ou de la province.

## Sous-section 3.—Mortalité puerpérale

Le nombre de mères mortes enceintes ou en couches a fort diminué durant les deux dernières décennies, comme l'indique le tableau 1, pp. 227-228. Bien que le nombre de naissances ait beaucoup augmenté ces dernières années, la mortalité puerpérale n'a pas cessé de diminuer depuis 1940 (soit 978 décès et un taux de 40 pour 10,000 naissances vivantes) pour atteindre 255 en 1957; le chiffre légèrement plus élevé de 263 en 1958 et 1959 a été suivi, en 1960 et 1961, des plus bas jusque-là (215 et 219). A partir de 1945, la mortalité puerpérale a été inférieure à 20 pour 10,000 naissances vivantes et s'est maintenue à moins de 10 à compter de 1951, pour s'établir au-dessous de 5 en 1960 et 1961. Malgré cette amélioration, la mortalité puerpérale au Canada (4.6 en 1961) dépasse le taux de plusieurs autres pays, notamment la Suède (3.7), l'Angleterre et le pays de Galles (3.4) et les États-Unis (3.2). La mortalité chez les mères non mariées est plus élevée que chez les mariées.