

13.—Diagnostiques des malades inscrits dans les hôpitaux pour tuberculeux répondeurs, suivant l'âge et le sexe, le 31 décembre 1962

NOTA.—Les chiffres comprennent les malades de 65 hôpitaux pour tuberculeux ainsi que les malades des quartiers pour tuberculeux des hôpitaux généraux, mais non les tuberculeux des hôpitaux pour maladies mentales.

Diagnostic	Groupe d'âge					Total ¹
	0-14	15-19	20-39	40-59	60 et plus	
NOMBRE						
Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	H. 334	113	679	953	963	3,047
F. 333	121	554	428	339	1,777	
Avec mention de maladie professionnelle du poumon.....	H. —	—	—	23	42	65
F. —	—	—	—	—	—	—
Pulmonaire minime.....	H. 36	29	117	123	106	411
F. 47	39	136	86	62	370	
Pulmonaire modérément avancée.....	H. 16	45	283	344	384	1,074
F. 22	48	248	185	141	645	
Pulmonaire très avancée.....	H. 6	12	241	448	421	1,131
F. 3	17	142	140	133	436	
Pulmonaire autre et non précisée.....	H. 6	3	8	2	4	23
F. 12	3	7	3	—	25	
Pleurésie avec ou sans épanchement.....	H. 18	15	28	12	5	78
F. 7	7	18	12	3	47	
Infection primaire.....	H. 237	8	2	—	—	247
F. 232	7	3	—	—	242	
Autre.....	H. 15	1	—	1	1	18
F. 10	—	—	2	—	12	
Tuberculose, autres formes.....	H. 34	11	54	54	33	186
F. 40	19	63	34	23	179	
TAUX POUR 100,000 HABITANTS						
Tuberculose de l'appareil respiratoire.....	H. 10.2	14.3	27.4	49.3	98.5	32.2
F. 10.8	16.1	22.0	22.4	32.3	19.1	
Avec mention de maladie professionnelle du poumon.....	H. —	—	—	1.2	4.3	0.7
F. —	—	—	—	—	—	
Pulmonaire minime.....	H. 1.1	3.7	4.7	6.4	10.8	4.3
F. 1.5	5.2	5.4	4.5	5.9	4.0	
Pulmonaire modérément avancée.....	H. 0.5	5.7	11.4	17.8	39.3	11.3
F. 0.7	6.4	9.9	9.7	13.4	6.9	
Pulmonaire très avancée.....	H. 0.2	1.5	9.7	23.2	43.1	11.9
F. 0.1	2.3	5.6	7.3	12.7	4.7	
Pulmonaire autre et non précisée.....	H. 0.2	0.4	0.3	0.1	0.4	0.2
F. 0.4	0.4	0.3	0.2	—	0.3	
Pleurésie avec ou sans épanchement.....	H. 0.6	1.9	1.1	0.6	0.5	0.8
F. 0.2	0.9	0.7	0.6	0.3	0.5	
Infection primaire.....	H. 7.3	1.0	0.1	—	—	2.6
F. 7.5	0.9	0.1	—	—	2.6	
Autre.....	H. 0.5	0.1	—	0.1	0.1	0.2
F. 0.3	—	—	0.1	—	0.1	
Tuberculose, autres formes.....	H. 1.0	1.4	2.2	2.8	3.4	2.0
F. 1.3	2.5	2.5	1.8	2.2	1.9	

¹ Comprend les groupes d'âges inconnus.

Des 75,300 malades mentaux déclarés au 31 décembre 1962, 34 p. 100 souffraient de schizophrénie,—la forme la plus fréquente de psychose (folie),—25 d'autres formes de psychose et 31 p. 100 de déficience mentale. Pour ce qui est de la plupart des classes de diagnostics, le sexe masculin l'emportait en nombre sur le féminin, sauf dans le cas de certaines psychoses, de névroses et de narcomanie.