

Les tableaux 15 et 16 démontrent la réduction considérable des taux de décès survenue depuis 1931 pour chaque groupe d'âge de la population. La réduction la plus importante de loin se trouve chez les jeunes des deux sexes. Toutefois, bien que la mortalité chez les femmes à tous les âges ait toujours été plus basse que chez les hommes, les taux féminins ont baissé plus vite et les écarts s'élargissent graduellement. Entre 1931 et 1965, les taux féminins ont diminué de 33.3 p. 100 contre 16.2 p. 100 seulement pour les taux masculins.

#### 15.—Variation procentuelle de la mortalité pour chaque groupe d'âge, 1931-1965

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Groupe d'âge	Hommes	Femmes
Moins d'un an.....	-72.2	-72.0	50 à 54 ans.....	-8.4	-42.2
1 à 4 ans.....	-83.8	-85.2	55 à 59 ".....	-1.9	-43.3
5 à 9 ".....	-68.2	-76.5	60 à 64 ".....	+6.1	-40.1
10 à 14 ".....	-66.7	-80.0	65 à 69 ".....	+1.7	-34.7
15 à 19 ".....	-52.0	-77.3	70 à 74 ".....	-0.2	-32.0
20 à 24 ".....	-46.9	-81.2	75 à 79 ".....	-6.2	-34.0
25 à 29 ".....	-52.9	-81.6	80 à 84 ".....	-7.7	-23.9
30 à 34 ".....	-51.4	-78.6	85 ans et plus.....	-7.3	-8.1
35 à 39 ".....	-47.6	-72.9			
40 à 44 ".....	-35.2	-60.0			
45 à 49 ".....	-22.2	-50.0			
			<b>Tous âges.....</b>	<b>-16.2</b>	<b>-33.3</b>

En dépit de la réduction considérable de la mortalité infantile, les décès sont encore plus nombreux durant la première année de vie qu'à toute autre année d'âge. De tous les décès enregistrés en 1931, près du quart ont été des décès d'enfants de moins de cinq ans et plus des trois quarts, des décès d'enfants de moins d'un an; en 1965, presque 8 p. 100 des décès sont survenus chez les enfants de moins de cinq ans et, sur ce groupe, 85 p. 100 se sont produits chez des enfants de moins d'un an. La majeure partie de la réduction a été notée chez les enfants âgés de plus d'un mois, mais une réduction notable a été observée également à tous les âges de l'enfance jusqu'à cinq ans.

